

ฝนแรก ระวัง! “ปลาน็อคน้ำ”

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนสภาพอากาศแปรปรวน คุณภาพน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน เช่น ความขุ่นสูงขึ้นจากน้ำหลาก และออกซิเจนในน้ำลดลง ทำให้ปลาเกิดการขาดออกซิเจนในน้ำอย่างรุนแรง จนทำให้ตายได้คราวละมากๆ ในระยะเวลาสั้น หรือเรียกว่าที่ “**ปลาน็อคน้ำ**” (Fish kill) โดยเฉพาะปลาในกระชังที่อยู่ในพื้นที่จำกัด



วิธีการป้องกันและแก้ไข “ปลาน็อคน้ำ”

- งดการให้อาหาร เพื่อลดการเน่าเสียของแหล่งน้ำที่เลี้ยง
- ควรปล่อยปลาในปริมาณที่เหมาะสมไม่หนาแน่นเกินไป
- ควรติดตั้งเครื่องให้อากาศ เพื่อให้ระดับออกซิเจนในน้ำ ไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ขณะที่เกิดภาวะปลาลอยหัวแล้ว เกษตรกรต้องเดินเครื่องให้อากาศอย่างทันที



ทั้งนี้ ผู้เลี้ยงปลากระชังสามารถรับมือกับช่วงฝนแรกที่จะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำได้ด้วยการเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อเพิ่มออกซิเจน และควรลดปริมาณอาหารหรืองดให้อาหารในวันที่ฝนตกเพื่อลดปริมาณของเสียในแหล่งน้ำ

ที่มาของข้อมูลวิธีการป้องกันและแก้ไข “ปลาน็อคน้ำ” : กรมประมง

สายด่วน



1650

หากพบปัญหาหมอลพิษ หรืออุบัติภัยสารเคมีสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินมายังกรมควบคุมมลพิษ