

**helya กะเล : かるบอนสีน้ำเงิน (Blue Carbon) แห่งท้องทะเล**



### ชวนท้าความรุ่งเรืองกับ หญ้าทะเล (Seagrass)



## ชนิดพันธุ์ของหญ้าที่เล

๑๕๔

- ในหนานหนานไทยพบหญ้ากระดิ่ง 13 ชนิด จากจำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 60 ชนิดพืชที่พบทั่วโลก (Waycott et al., 2004)
    - ในฟลีทเบร์เจียนด้าวพันธุ์กระดิ่ง 12 ชนิด มากเพื่อชนิดเดียวคือ หญ้ากระคนแห้ง (Ruppia maritima)
    - ส่วนใหญ่กว่าที่ไทยพบทั้งหมด 12 ชนิดใช้ค้น โคลิมั่นพันธุ์เขียวในทะเล (Halophila major) (Tuntiprapas, et al., 2015)
    - หญ้ากระดิ่งสามารถแบ่งได้成สองกลุ่มนี้ ใบเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ใบเป็นแบบยาวหรือใบกอยดะยาว และกลุ่มที่ 2 ใบเป็นแบบหักบends ไป



ສານກາພແລງທຸກທະເລ ພ.ມ. 2563



- เนป พศ. 2564 ราบานพบทญาทะເລມ  
ພື້ນທີ່ຮວມ 99,325 ໄກສີ ອີເມີນຮອບລະ 62 ຂອງ  
ພື້ນທີ່ທີ່ມີຄັກພາກເປັນແລ້ວທໍ່ຫຍຸ້າທະເລຂອງປະເທດ  
(160,628 ໄກສີ)
  - ແລ້ວທໍ່ຫຍຸ້າທະເລໄດ້ຕັບພາກຮວມຂອງປະເທດໄກຢ  
ພບວ່າແລ້ວທໍ່ຫຍຸ້າທະເລ ມີສຳຄັນກາພ  
ສມບູຮົມຕີ - ຕື່ມາດ ຮົບລະ 28  
ສມບູຮົມປັນຄອງຈາງ ຮົບລະ 52  
ສມບູຮົມເຈັກນ້ອຍ ຮົບລະ 20

ราชบุคคลามติอย่างไร  
บันทึกการที่ได้รับครัชทบทวนคิดถึงต่างๆ

1) ภาวะโลกร้อน (Greenhouse effect) ส่งผลอุณหภูมิน้ำท่าเรือสูงมากกว่ากลางป่าตึ

- สัณห์ต่อค่าเงินรุ่นเป็นปี การออกผลค่าใช้จ่ายเมื่อตนของหญ้าทราย (Short and Neckles,1999)

  - 2) ลักษณะที่ เนตรากลางวันนี้ได้รับผลกระทบต่ำกว่าหญ้าทรายในผืนทราย
  - 3) ภารเด่นเรื่อง และการซัมจูงทางน้ำ ล่างพืชกระหนบทึ่งทางตรงและทางอ้อมต่อแหล่งหญ้าทราย ทำให้ในหญ้าทรายเลือกตัดข้าว หน้าดินนิ่นคุ้ย
  - 4) ภารทำปริมาณบางประเภท เช่น คราฟหอย เรืออวนจากขนาดเด็ก เรืออวนรุ่น เรืออวนทับทิ่งขนาดใหญ่ ที่ทำภารปริมาณใหม่แหล่งหญ้าทราย คือให้เกิดความเสื่อมที่รวมแก่แหล่งหญ้าทราย
  - 5) น้ำแล毅ตามชาบเพื่อกรอง เช่น ภารที่ทำให้อ่อนตัว ทำให้บินเรือ ลักษณะป่า โรงร่างอุตสาหกรรม ชุมชนบ้านเรือน และภารที่นาค้าง ทำให้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อภารเจริญเติบโตของหญ้าทราย

